



Rendez-vous vaccinal des 11-13 ans

VOTRE ENFANT RENTRE AU COLLÈGE

*Est-il à jour
de ses vaccinations ?*



D'après le calendrier vaccinal 2015¹

Quizz 2



La vaccination, à quoi ça sert ?

Nourrissons, enfants, adolescents, adultes...

À tout âge, la vaccination et les rappels vaccinaux permettent :

- ➡ De ne pas contracter la maladie.
- ➡ D'éviter des complications potentielles de la maladie qui peuvent laisser des séquelles.
- ➡ De ne pas transmettre la maladie à l'entourage et aux plus faibles d'entre nous : enfants, personnes âgées, malades...

Le calendrier des vaccinations, qu'est-ce que c'est ?

Le calendrier des vaccinations définit chaque année les vaccinations recommandées en fonction de son âge.

On y trouve pour chaque vaccin :

- ➡ le nombre d'injections à faire
- ➡ l'âge auquel il faut les faire

Peut-on se faire vacciner si l'on est fiévreux ?

En règle générale, il vaut mieux être en bonne santé pour se faire vacciner. Toutefois, une fièvre peu élevée ou un épisode infectieux mineur (rhino-pharyngite, rhume) ne constituent pas des contre-indications à la vaccination.

Votre médecin saura vous conseiller.



Peut-on recevoir 2 vaccins différents le même jour ?

Dans beaucoup de cas deux vaccins peuvent être administrés le même jour à condition de ne pas piquer au même endroit.

Êtes-vous à jour ? Qu'est-ce que ça veut dire ?

- ➔ Pour être à jour il faut : avoir fait les vaccins recommandés avec le bon nombre d'injections, en fonction de son âge
- ➔ Être à jour dans ses vaccinations permet d'être bien protégé

Le rattrapage, qu'est-ce que c'est ?

Il existe 2 situations dites de rattrapage :

- La vaccination n'a pas été réalisée à l'âge recommandée. Dans ce cas, la vaccination de rattrapage permet de se mettre à jour.

- Le schéma vaccinal n'a pas été terminé. Dans ce cas, il n'est généralement pas nécessaire de tout recommencer.

Le rattrapage consiste à reprendre la vaccination au stade où elle a été interrompue et à la compléter en tenant compte du nombre de doses manquantes et de l'âge de la personne.

Dans tous les cas, votre médecin saura vous conseiller.

Le rendez-vous vaccinal

**POUR TOUS LES
ADOLESCENT(E)S**



**Rappel :
Diphtérie (d)*
Tétanos (T)
Coqueluche (ca)*
Poliomyélite (Polio)**

La vaccination de rappel dTcaPolio est recommandée entre 11 et 13 ans avec un vaccin combiné contenant des doses réduites d'anatoxine diphtérique et d'antigènes coquelucheux (dTcaPolio).



**SCHÉMA
VACCINAL**

1 dose

➔ Période de transition :

Les enfants ayant reçu un vaccin dTPolio (ou dTcaPolio) à 6 ans, il convient d'administrer un vaccin DTcaPolio entre 11 et 13 ans.

Pour ceux ayant reçu un vaccin DTcaPolio à 6 ans, il convient d'administrer un dTcaPolio entre 11 et 13 ans.

*d: dose réduite d'anatoxine - ca : dose réduite d'antigène coquelucheux

des 11-13 ans



**POUR TOUTES
LES JEUNES FILLES**

**Papillomavirus
Humain (HPV)**

La vaccination est recommandée pour toutes les jeunes filles âgées de 11 à 14 ans.

La vaccination est d'autant plus efficace que les jeunes filles n'ont pas encore été exposées au risque d'infection par le HPV.

La vaccination contre les infections à papillomavirus ne se substitue pas au dépistage des lésions pré-cancéreuses et cancéreuses du col de l'utérus par le frottis cervico-utérin, y compris chez les femmes vaccinées, mais vient renforcer les mesures de prévention.

À partir de 25 ans, toutes les jeunes femmes vaccinées ou non vaccinées doivent continuer à bénéficier du dépistage par frottis selon les recommandations en vigueur.

**SCHEMA
VACCINAL**

2 doses (0, 6 mois)*

L'une des doses de la vaccination contre les infections à papillomavirus humains peut être co-administrée notamment avec le rappel d'InaPolio prévu entre 11 et 13 ans ou un vaccin hépatite B dans le cadre du rattrapage vaccinal.

*voir tableau récapitulatif des vaccinations en dernière page

Les vaccinations de

ADOLESCENT(E)S JUSQU'À 15 ANS RÉVOLUS



Hépatite B

Un rattrapage vaccinal est recommandé pour les adolescents âgés de 11 à 15 ans révolus, non antérieurement vaccinés.

Tout enfant ou ado âgé de moins de 16 ans, non antérieurement vacciné, devrait se voir proposer la vaccination hépatite B à l'occasion d'une consultation médicale ou de prévention.

SCHÉMA VACCINAL*

- Classique en 3 doses (0, 1 à 2 mois, 6 mois)
- Simplifié en 2 doses (0, 6 mois)

* Vaccination avec l'un des deux vaccins ayant l'AMM pour cette indication en respectant un intervalle de six mois entre les deux doses, et en l'absence de risque élevé d'infection par le virus de l'hépatite B dans les six mois qui séparent les deux injections.

ADOLESCENT(E)S JUSQU'À L'ÂGE DE 24 ANS RÉVOLUS

Méningocoque C

La vaccination systématique avec une seule dose de vaccin méningococcique C conjugué est recommandée pour tous les nourrissons à l'âge de 12 mois. Durant la période initiale de mise en place de cette stratégie et en attendant son impact optimal par la création d'une immunité de groupe, l'extension de cette vaccination systématique jusqu'à l'âge de 24 ans révolus est aussi recommandée avec un vaccin méningococcique C conjugué selon le même schéma vaccinal à une dose.

SCHÉMA VACCINAL

1 dose de vaccin
méningococcique C conjugué

rattrapage chez l'ado



FILLES DE 15 À 19 ANS RÉVOLUS

Papillomavirus Humains (HPV)

Dans le cadre du rattrapage vaccinal, la vaccination est recommandée pour les jeunes filles et jeunes femmes entre 15 et 19 ans révolus.

La vaccination contre les infections à papillomavirus ne se substitue donc pas au dépistage des lésions pré-cancéreuses et cancéreuses du col de l'utérus par le frottis cervico-utérin, y compris chez les femmes vaccinées, mais vient renforcer les mesures de prévention.

À partir de 25 ans, toutes les jeunes femmes vaccinées ou non vaccinées doivent continuer à bénéficier du dépistage selon les recommandations en vigueur.

SCHÉMA VACCINAL

3 doses selon le schéma
0, 1, 6 mois ou 0, 2, 6 mois
selon le vaccin utilisé.



Rougeole (R) Oreillons (O) Rubéole (R)

PERSONNES NÉES DEPUIS 1980

Les personnes nées depuis 1980 devraient avoir reçu au total deux doses de vaccin trivalent, en respectant un délai minimum d'un mois entre les deux doses, quels que soient les antécédents vis-à-vis des trois maladies.

SCHÉMA VACCINAL

0, 1 ou 2 doses en fonction
des antécédents vaccinaux

Calendrier vaccinal des ados en 2015

	VACCINATION	11-13 ANS	14 ANS	15 ANS	17 ANS
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES	DIPHTÉRIE (d) TÉTANOS (T) POLIOMYÉLITE (Polio)	1 dose			
	COQUELUCHE (ca)	1 dose ¹			
	PAPILLOMAVIRUS HUMAINS (HPV)	Pour les filles vaccin quadrivalent (11/13 ans) ou vaccin bivalent (11/14 ans) 2 doses (0, 6 mois)			
RATTRAPAGE	PAPILLOMAVIRUS HUMAINS (HPV)			Pour les filles, 3 doses selon le schéma 0, 1, 6 mois ou 0, 2, 6 mois (jeunes filles de 14 ou 15 ans à 19 ans révolus) selon le vaccin utilisé	
	HÉPATITE B	2 doses selon le schéma 0, 6 mois ²			
	MÉNINGOCOQUE C (vaccin conjugué)	1 dose jusqu'à 24 ans ³			
	ROUGEOLE (R) OREILLONS (O) RUBÉOLE (R)	6 - 17 ans 2 doses à au moins 1 mois d'intervalle si pas de vaccin antérieur ; 1 dose si une seule dose vaccinale antérieure			

¹ dTcaPolio : vaccin combine diphtérie, tétanos, poliomyélite et coqueluche avec des doses réduites d'anatoxine diphtérique (d) et d'antigènes coquelucheux (ca).

² Ce schéma vaccinal à 2 doses n'est possible qu'avec les vaccins ayant l'AMM pour cette indication en respectant un intervalle de 6 mois entre les 2 doses.

³ Durant la période initiale de mise en place de la vaccination systématique des nourrissons à 12 mois et en attendant son impact optimal par la création d'une immunité de groupe, une vaccination de rattrapage selon le même schéma vaccinal à une dose est aussi recommandée jusqu'à l'âge de 24 ans révolus.

*Pour plus d'informations,
parlez-en à votre médecin ou
demandez conseil à votre pharmacien.*

1. Calendrier vaccinal et recommandations vaccinales 2015, disponible sur www.sante.gouv.fr/

2. INPES. Planète vaccination, 2015. <http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1074.pdf>
site consulté le 20 avril 2015.

www.vaccination.fr

Une information de Sanofi Pasteur MSD